



服用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に、読めるように大切に保管してください。

第 類医薬品

「モリ」ハイツウ錠

特 徴

「モリ」ハイツウ錠は、薏苡仁、防已など成分欄記載の 9 種類の生薬で構成される和漢薬の、のみやすいエキス糖衣錠です。本剤の服用で、体の各部の神経に沿って走る痛み、関節の痛みやハシ、こわばりなど不快な症状が改善され、神経痛、リウマチに効きめがあります。



使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください。
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - 本人又は家族がアレルギー体質の人。
 - 薬によりアレルギー症状やぜんそくを起こしたことがある人。
 - 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
 - 次の症状のある人。
むくみ、排尿困難

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。

- 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 心	発疹・発赤、かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。
その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、 まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧 が高くなる、頭痛等があらわれる。

- 1 ヶ月位服用しても症状がよくなる場合

3. 長期連用する場合には、医師又は薬剤師に相談してください。

効能又は効果

神経痛、リウマチ

用法及び用量

次の量を朝夕空腹時に、水またはお湯で服用してください。

年 齢	1 回 量	1 日服用回数
成人 (16 歳以上)	3 錠	2 回
15 歳以下 8 歳以上	2 錠	

<用法及び用量に関連する注意>

小児に服用させる場合は、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

成分及び分量

本剤 6 錠 (2.4 g) 中、下記生薬の水製乾燥エキス 1.2 g が含まれています。

ヨクイニン (薏苡仁) ……2g	ケイヒ (桂皮) ……0.75 g
カンゾウ (甘草) ……1g	シャクヤク (芍薬) ……0.75 g
ソウジュツ (蒼朮) ……1g	ポウイ (防已) ……0.25 g
トウキ (当帰) ……1g	ブクリョウ (茯苓) ……0.12 g
マオウ (麻黄) ……1g	

添加物として、白糖、タルク、アラビアゴム、酸化チタン、ステアリン酸マグネシウム、ポリビニルアセタールジエチルアミノアセテート、カルナウバロウ、黄色4号(タートラジン)を含有しています。

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります)

本剤についてのお問い合わせ先

大杉製薬株式会社 お客様相談室
〒545-0002 大阪市阿倍野区天王寺町南1-1-2
電話 (06) 6629-0062
受付時間 10時から17時まで(土、日、祝日を除く)

大杉製薬株式会社

大阪市阿倍野区天王寺町南1-1-2