

ご使用に際して、この説明文を必ずお読みください。

うすめずそのまま使用できる

ケンエーうがい薬C

第3類医薬品

△ 使用上の注意

してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

次的人は使用しないでください 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人

相談するここと 1. 次の人は使用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

●薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人を受けた人 ●甲状腺機能障害の診断

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 脊	発疹・発赤、かゆみ
口	あれ、しみる、灼熱感、刺激感
消 化 器	吐き気
そ の 他	不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります
その場合は直ちに医師の診療を受けてください

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

3.5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この製品を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

製造番号、使用期限は容器底面に記載



健栄製薬株式会社

大阪市中央区伏見町2丁目5番8号
電話番号 06(6231)5626

特
徴

- ケンエーうがい薬Cは、各種の細菌、真菌、ウイルスなどの微生物に迅速な殺菌・消毒効果があるポビドンヨードを配合したうがい薬で、口腔内及びのどの殺菌・消毒・洗浄、口臭の除去にすぐれた効果を発揮します
- 1-メントール（添加物：矯味剤）により、すっきりとしたやや強めの清涼感を持つうがい薬です

〔效能効果〕

口腔内及びのどの殺菌・消毒・洗浄、口臭の除去

〔用法用量〕 うすめずそのまま適量（約15mL～20mL）を口に含んで、2～3回うがいをしてください。これを1日数回行ってください。

〔用法用量に関連する注意〕

●用法用量を厳守してください ●小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください ●本剤はうがい用にのみ使用し、キズややけどへの使用や、内服はしないでください ●目に入らないように注意してください 万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください

〔成分分量〕 100mL中 ポビドンヨード350

mg（有効ヨウ素として35mg）含有
添加物：エタノール、グリセリン、1-メントール、サッカリンNa水和物、その他1成分

〔成分分量に関連する注意〕

本剤の使用により、銀を含有する歯科材料（義歯等）が変色することがあります
〔保管及び取扱い上の注意〕

●直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください ●小児の手の届かない所に保管してください ●他の容器に入れ替えないでください（誤用の原因になったり品質が変わることがあります） ●衣類等に付着したときは、すぐに水で洗い落としてください ●使用期限を過ぎた製品は使用しないでください



- キャップの内側に目盛りがついています。
- 内容液は茶色です。
- 本剤は、うがい以外に使用しないでください。

副作用被害救済制度
☎ 0120-149-931

ボトル：PET
キャップ：PP
ラベル：PS
瓶ериал：PE