

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

**目薬** スマイルコンタクト クールブラック **第3類医薬品**

## スマイルコンタクト クールブラックの特徴

コンタクトで負担がかかるつらい目の疲れに。

**超清涼感**が持続!

### うるおい+涙本来の4つの働き

#### 酸素補給

L-アスパラギン酸カリウムが  
瞳に酸素を補給。

#### 栄養補給

涙にも含まれる  
アミノ酸を補給。

#### 角膜保護

角膜保護成分が、  
乾燥によるダメージから  
瞳を守ります。

#### 老廃物排出

目やにや、ほこりを  
洗い流します。



### 清涼感レベル



すべてのコンタクトレンズ装用中に使えます。  
またレンズをはずした後にもご使用いただけます。

**ソフト**

**ハード**

**O<sub>2</sub>**

**使い捨て**

防腐剤(塩化ベンザルコニウム、ソルビン酸カリウムなど)を  
配合していません。


### 【ツイストキャップの開閉方法】

キャップ部分をまっすぐ上にして開閉してください。

※容器の中心を押さえたまま開閉すると、薬液が飛び出すことがあります。  
容器の側面をもって開閉してください。


#### ① 開け方

キャップを手前  
にひねります



#### ② 閉め方

カチッと音が  
するまでまっすぐ  
押し下げます



## ⚠ 使用上の注意

### 👤 相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください  
(1) 医師の治療を受けている人。  
(2) 本人又は家族がアレルギー体質の人。  
(3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。  
(4) 次の症状のある人。…はげしい目の痛み  
(5) 次の診断を受けた人。…緑内障
2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください  
(1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ、しみて痛い

- (2) 目のかすみが改善されない場合
- (3) 2週間位使用しても症状がよくなる場合

## ● 効能・効果

ソフトコンタクトレンズ又はハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感、涙液の補助(目のかわき)、目の疲れ、目のかすみ(目やにの多いときなど)

## ● 用法・用量

1日3~6回、1回1~3滴を点眼してください。

### 〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) 容器の先をまぶた、まつ毛に触れさせないでください。  
汚染や異物混入(目やにやほこり等)の原因になります。  
また、混濁したものは使用しないでください。
- (3) 点眼用にのみ使用してください。



容器の先を下に向けて点眼

## ● 成分(100mL中)

有効成分	含 量
コンドロイチン硫酸エステルナトリウム(角膜保護成分)	0.25g
タウリン(アミノ酸成分)	0.2g
L-アスパラギン酸カリウム(アミノ酸成分)	0.1g
塩化ナトリウム(ミネラル成分)	0.2g
ポビドン(うるおい成分)	0.25g

\*添加物として、トロメタモール、ホウ酸、ホウ砂、エデト酸Na、プロピレングリコール、*l*-メントール、*d*-カンフルを含む。

## ● 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 他の人と共用しないでください。
- (5) 使用期限(外箱の底面に書いてあります)の過ぎた製品は使用しないでください。  
なお、使用期限内であっても一度開封した後は、なるべく早くご使用ください。
- (6) 容器を横にして点眼したり、保存の状態によっては、容器の先やキャップ部分に成分の結晶が付着することがあります。その場合には清潔なガーゼで軽くふき取ってご使用ください。

※この目薬は、携帯袋を入れておりません。

**ライオン株式会社**  
〒130-8644 東京都墨田区本所1-3-7

お問合せ先  
ライオン株式会社 お客様センター

**0120-813-752**

受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)