

## 効能効果

のどの炎症によるのどの痛み・のどのはれ・のどのあれ・のどの不快感・声がれ、口内炎

## 用法用量

- 1 日数回、適量を患部に噴射塗布してください。  
(**用法用量に関連する注意**)
- (1)用法用量を厳守してください。
  - (2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
  - (3)のどや口内の患部の塗布用におのみ使用し、内服しないでください。
  - (4)息を吸いながら使用すると、薬液が気管支や肺に入ることがありますので、のどに使用する場合には、ノズルをのどの患部に向けて、声を出しながら噴射してください。
  - (5)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けてください。

## 成分分量

100mL中  
アズレンスルホン酸ナトリウム水和物 20mg、  
セチルピリジニウム塩化物水和物 300mg 含有  
添加物：グリセリン、プロピレングリコール、  
L-メントール、サッカリンナトリウム水和物、  
ヒドロキシエチルセルロース、リン酸水素ナトリウム水和物、無水リン酸二水素ナトリウム、  
エタノール、サリチル酸メチル、香料

## 保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない涼しい所にノズルカバーをして保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)。
- (4)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。
- (5)本剤使用後の一定時間は、呼吸中に酒気帯び運転と判定される濃度以上のアルコール濃度が検出される可能性がありますので、運転中のご使用はお控えください。

健栄製薬(株)お問い合わせ先

電話番号 0(6) 6231-5822


受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)




健栄製薬株式会社

大阪市中央区伏見町2丁目5番8号

## 使用法




①ノズルカバーを取り外してください。



②「アー」と声を出しながら、患部に適量(目安として1~3回)噴射してください。

※最初は液が出るまで数回押してください。

※薬液がノズルの先端にたまった時は、液だれを防ぐため清潔なティッシュペーパー等で拭き取ってください。



③使用後は、ノズルカバーを元の位置にはめてください。

ノズルの先端の穴を針等で突かないでください。使用時に薬液が出にくくなる場合があります。

のどの痛み・はれ、口内炎に

# のどスッキリ スプレー AC

水溶性アズレン **W** CPG  
抗炎症成分 **処方** 殺菌成分

さわやかミント味



ノズルカバー付なので  
携帯に便利

30mL

第3類医薬品



ご使用に際して、外箱の説明文を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

口腔咽喉薬 **第3類医薬品**

販売名: のどスッキリスプレーAC

**!** 使用上の注意

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)  
長期連用しないでください。

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
(1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。  
(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。  
(3) 口内のひどいただれのある人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
口	刺激感
消化器	胃部不快感、吐き気

3. 5~6日間使用しても症状がよくなりえない場合は使用を中止し、この外箱を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

副作用被害救済制度の問合せ先  
(独)医薬品医療機器総合機構  
[http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai\\_camp/index.html](http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html)  
電話 0120-149-931(フリーダイヤル)



製造番号

使用期限

