

※※2013年1月改訂（第4版）
※ 2012年1月改訂

外用殺菌消毒剤 滅菌製剤

日本標準商品分類番号 872612

第3類医薬品

ポピコット綿球P

(10%ポビドンヨード液含浸綿球)

承認番号	(17AP)213
承認年月	2005年3月
販売開始	2005年11月

貯法：気密容器・室温保存
使用期限：容器等に表示

POPICOTTO® COTTON BALL P


△ 使用上の注意

※ 【してはいけないこと】 ❌

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

※ 次の人は使用しないでください

本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

※ 【相談すること】 

※ 1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (3) 患部が広範囲の人。
- (4) 深い傷やひどいやけどの人。

※ 2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮ふのかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

※ 3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【効 能 効 果】 きり傷、さし傷、すりむき傷、靴ずれ、やけど等の患部の殺菌・消毒。
とびひ、おでき等の感染皮膚面の殺菌・消毒。

【用 法 用 量】 1日数回患部に塗布。

〈用法用量に関連する注意〉

- (1) 用法用量を厳守してください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。
なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (4) 石けん類は本剤の殺菌作用を弱めるので、石けん分を洗い流してから使用してください。
- (5) 外用にのみ使用してください。

※※【成 分】

#14綿球	綿球1球（脱脂綿0.18g）あたり 10w/v%ポビドンヨード液1.8mL含浸
#20綿球	綿球1球（脱脂綿0.44g）あたり 10w/v%ポビドンヨード液4.4mL含浸

添加物：グリセリン、クエン酸水和物、リン酸水素2Na、ラウロマクロゴール、pH調整剤

- 【保管及び取扱い上の注意】**
- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
 - (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
 - (3) 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わることがあります。）
 - (4) 衣類等に付着したときは、すぐに水で洗い流してください。
 - (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。
 - (6) 開封時及び開封後は、微生物による汚染に注意してください。
綿球は清潔なピンセット等を用いて使用し、綿球に指が触れないよう注意してください。
 - (7) 開封後は速やかに使用してください。
- 【包装】**
- #14綿球×1球×90（6連球×15）
 - #20綿球×1球×90（6連球×15）