

ビタミンC「ケンエー」

⚠ 使用上の注意

相談すること

1. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この外箱を持って医師、歯科医師又は薬剤師に相談してください。

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
消化器	悪心・嘔吐

(2) 1カ月位服用しても症状がよくなる場合

2. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください。

下痢

[効能・効果]

○ 次の諸症状の緩和：

しみ、そばかす、日焼け・かぶれによる色素沈着

○ 次の場合の出血予防：

歯ぐきからの出血、鼻出血

「ただし、これらの症状について、1カ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師、薬剤師又は歯科医師に相談すること。」

○ 次の場合のビタミンCの補給：

肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時、老年期

[用法・用量]

15歳以上・・・・・・・・・・ 1回1包
11歳以上 15歳未満・・・・ 1回2/3包
7歳以上 11歳未満・・・・ 1回1/2包
3歳以上 7歳未満・・・・ 1回1/3包
1歳以上 3歳未満・・・・ 1回1/4包
いずれも1日2～3回食後に服用してください。

<用法・用量に関連する注意>

- (1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (2) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (3) 本剤は、1歳未満の乳児には服用させないでください。

[成分・分量]

本品 1包 (0.6g) 中 日局 アスコルビン酸 0.6g 含有。

製造番号

使用期限

ご使用に際して、外箱の説明文を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう商品と共に大切に保管してください。

<成分・分量に関連する注意>

本剤の服用により、尿及び大便の検査値に影響を及ぼすことがありますので、これらの検査を受ける場合は、本剤を服用していることを医師にお知らせください。

[保管及び取扱い上の注意]

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) 1包を分割した残りを使用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に使用してください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。



健栄製薬株式会社

大阪市中央区伏見町2丁目5番8号
電話番号 06(6231)5626