

**2020年 3月(第3版)
*2018年 3月(第2版)

貯 法:直射日光を避け、室温保存
使用期限:製品ならびに外箱に記載

使用に際しては、この文書を必ずお読みください。
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

日本標準商品分類番号	
872619	
承認番号	22900APX00168000
承認年月	2017年5月
販売開始	2017年5月

第2類医薬品 ^{**} 外皮用殺菌消毒剤〈滅菌済〉

オオサキCHG消毒綿0.2%

特 徴

本品は医療脱脂綿に外用消毒剤(0.2w/v%クロルヘキシジングルコン酸塩水溶液)を含浸したものを包装し、滅菌した製品です。

個包装で使い切りのため、衛生的にお使いただけ携帯にも便利です。アルコール製剤ではないため、アルコール禁忌の方にもお使いいただけます。

効能・効果

手指・皮膚の消毒、医療機器の消毒

用法・用量

そのまま塗擦、清浄用として用いる。

(用法・用量に関する注意)

- (1) 用法・用量を厳守すること。
- (2) 外用にのみ使用すること。
- (3) 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、直ぐに水又はぬるま湯でよく洗い、直ちに眼科医の診療を受けること。
- (4) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- (5) 石けん類や血清、膿汁等が付着していると、十分な効果が得られないことがあるため、十分に洗い流してから使用すること。
- (6) やけどのような痛みを伴う炎症を起こすことがあるため、溶液の状態で長時間皮膚と接触させないこと。
- (7) 一度個包装を開封したものは、無菌状態が保てないため、開封後は直ちに使い切ること。
- (8) 個包装が開封、破損や他の汚染が見られる場合は使用しないこと。
- (9) 注射器・カテーテル等の神経や粘膜面に接触する可能性のある器具を消毒した後は、滅菌精製水でよく洗い流した後に使用すること。

⚠ 使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の人は使用しないこと

* 本剤又は本剤の成分、クロルヘキシジンによりアレルギー症状を起こしたことがある人

2. 次の部位には使用しないこと

- ・ 膣、膀胱、口腔等の粘膜面
- ・ 創傷面
- ・ 目のまわり
- ・ 広範囲の患部、深い傷やひどいやけど、ひどいただれ



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人
- (3) 薬や化粧品等によりアレルギー症状(発疹・発赤、かゆみ等)を起こしたことがある人

* 2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。
その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

成分・分量

本品 100mL 中
クロルヘキシジングルコン酸塩水溶液 (20w/v%) 1mL
医療脱脂綿 19.56g

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 綿に小さな黒色あるいは黄色の斑点状のものが見られる場合があるが、これは綿花の葉や種子の一部で、使用上の問題はない。
- (4) 誤用や品質の低下を避けるため、再使用や他の容器に移し替えないこと。
- (5) 使用後は、トイレに流さないで、衛生的に処理すること。

消費者相談窓口

本品についてのお問い合わせ先
お客様相談室 ☎0120-15-0039
(受付時間 10:00 ~ 17:00※土・日、祝日を除く)

製造販売業者等の氏名又は名称及び住所

製造販売元
オオサキメディカル株式会社
〒452-0812 名古屋市西区玉池町203番地