

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

第2類医薬品

# 胃痛・胃もたれ・胸やけにスクラート胃腸薬(錠剤)

こんな方に効きます



胃の痛み



胃もたれ



胸やけ



むかつき

胃の中が空っぽの  
空腹時・睡眠中にも効く  
胃痛のもとに直接効く  
「患部修復機能」胃腸薬

○胃痛のもと(荒れた患部)を保護・修復します

スクラルファートが胃の荒れた患部を選んで吸着し、胃酸などの攻撃から保護するとともに、患部を修復して、もとから治していきます。さらに、アズレンスルホン酸ナトリウムとL-グルタミンが炎症をしずめ患部の修復を促進します。

○すばやく、かつ持続的に胃酸を中和します

炭酸水素ナトリウムと合成ヒドロタルサイトが症状のもととなる胃酸をすばやくかつ持続的に中和します。さらに、ロートエキスが胃の神経をしずめ、胃酸の分泌を抑えます。

○消化酵素が弱った胃の働きを助けます

脂肪を分解するリパーゼAP6と、でんぷんを分解するジアスマンSSが、効果的に消化を助けます。

## △使用上の注意

### ⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の人は服用しないでください  
透析療法を受けている人。
2. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください  
胃腸鎮痛鎮痙薬
3. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください  
(母乳に移行して乳児の脈が速くなることがある。)
4. 長期連用しないでください



### ■ 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
(1) 医師の治療を受けている人。  
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。  
(3) 高齢者。  
(4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。  
(5) 次の症状のある人。  
排尿困難  
(6) 次の診断を受けた人。  
腎臓病、心臓病、緑内障
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
□のかわき、便秘
4. 2週間位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

### その他の注意

母乳が出にくくなる場合があります。

(必ず裏面もお読みください)

## 効 能

胃痛、もたれ(胃もたれ)、胸やけ、胃酸過多、げっぷ(おくび)、胃重、胃部膨満感、胃部不快感、胸つかえ、食べ過ぎ(過食)、消化不良、消化不良による胃部・腹部膨満感、消化促進、食欲不振(食欲減退)、飲み過ぎ(過飲)、はきけ(むかつき、二日酔・悪酔のむかつき、胃のむかつき、嘔気、悪心)、嘔吐

## 用法・用量


次の量を食間\*・就寝前又は食後に服用してください。

\*食間とは、食後2～3時間経過し、胃の中に食べ物がほぼなくなっている時です。

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15才以上)	3錠	3回
15才未満	×服用しないでください	

〈用法・用量に関連する注意〉 用法・用量を厳守してください。

## 成分 1日服用量(9錠)中



上層 (淡紫青色)	・アズレンスルホン酸ナトリウム……………6mg ・L-グルタミン……………400mg ・炭酸水素ナトリウム……………450mg ・合成ヒドロタルサイト……………375mg
中層 (淡褐色)	・ロートエキス3倍散……………90mg (ロートエキスとして……………30mg) ・ジアズメンSS……………60mg ・リパーゼAP6……………60mg
下層 (白色)	・スクラルファート水和物……………1500mg ・合成ヒドロタルサイト……………225mg

添加物として、ヒドロキシプロピルセルロース、乳糖、マクロゴール、カルボキシメチルスターチNa、CMC、セルロース、バレイショデンプン、硬化油、二酸化ケイ素、ステアリン酸Ca、香料を含有します。

### 〈成分に関連する注意〉

本剤の青みがかった色は有効成分(アズレンスルホン酸ナトリウム)の色です。服用に支障はありません。

## 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)。
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

## お問合せ先

スクラート胃腸薬(錠剤)についてのお問合せは、お買い求めのお店又は下記のお客様センターまでご連絡ください。

ライオン株式会社 お客様センター **0120-813-752**  
受付時間 9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

ライオン株式会社  
〒130-8644 東京都墨田区本所1-3-7