

第3類医薬品

ロイヒつば膏

肩こり腰痛に



156枚

温感刺激で血行促進

使用前にこの説明書を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

さけくわ

販売名

ロイヒつば膏

第3類医薬品

品番 RT156

鎮痛消炎温感プaster

ロイヒつば膏®はノニル酸ワニルアミドの温感刺激により患部の血行を促進し、サリチル酸メチル、ℓ-メントールなどの鎮痛消炎作用とあわせ、すぐれた効果をあらわします。

【使用上の注意】

※【してはいけないこと】(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の部位には使用しないでください。

①目の周囲、粘膜等。②湿疹、かぶれ、キズぐち。

■【相談すること】

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください。

①本人又は家族がアレルギー体質の人。

②薬によりアレルギー症状(例えば発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人。

2. 次の場合は直ちに使用を中止し、この説明書をもって医師又は薬剤師に相談してください。

①使用後、次の症状 関係部位 症 状
があらわれた場合 皮 膚 発疹・発赤、かゆみ、痛み

②5～6日間使用しても症状がよくならない場合

【その他の注意】

①入浴する時は、貼った場所がヒリヒリする場合がありますので、必ず30分～1時間位前には、はがしてください。貼ったままの入浴はしないでください。

②発熱するもの(コタツ、ホットカーペット、カイロ、電気毛布等)と併用しますと、刺激が強くなる場合がありますので、ご注意ください。

〈効能・効果〉肩のこり、腰の痛み、打撲、捻挫、関節痛、筋肉痛、筋肉疲労、しもやけ、骨折痛

〈用法・用量〉ロイヒつば膏®の背面をフィルムからはがし、患部にお貼りください。

〈用法・用量に関連する注意〉

①小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。

②皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側に1cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が発現しないことを確かめてから使用してください。

③汗などをよく拭きとり、患部をきれいにしてからお貼りください。

④皮膚の弱い人は、同じところには続けて貼らないでください。

⑤体質によってはかぶれ等が生じることがありますので、入浴直後の貼付はさけてください。

⑥本品は外用にのみ使用し、内服しないでください。

〈包装〉直径2.8cm・・・156枚 保存袋1枚付き

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構

<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>

☎0120-149931

MADE IN JAPAN 日本製

NB09J03 各は登録商標です。

ニチバン株式会社

〒112-8663 東京都文京区関口2-3-3

お客様相談室 ☎0120-377218

<http://www.nichiban.co.jp/>

受付時間: 9:00～12:00、13:00～17:00

(土、日、祝日を除く)

〈保管及び取扱い上の注意〉

①小児の手のとどかない所に保管してください。

②直射日光をさけ、なるべく湿気の少ない涼しい所に保管してください。

③誤用をさけ、品質を保持するため、開封後は、製品袋ごと保存袋に入れて保管してください。

④保管の際は、できるだけ中の製品を押さえつけないようにしてください。

【貼り方の参考例】下図を参考に、指で押してみても痛みを感じる場所、こりがあるところを中心に貼ってください。



例1 肩こり

例2 肩こり

例3 肩こり・腰痛

例4 腰痛

〈成分・分量〉

1㎡中	サリチル酸メチル	10.76g
	ℓ-メントール	4.87g
	ハッカ油	0.53g
	dℓ-カンフル	3.77g
	チモール	0.07g
	ノニル酸ワニルアミド	0.04g

添加物として、生ゴム、ポリイソブチレン、ポリブテン、石油系樹脂、BHT、重質炭酸カルシウム、カーボンブラック、三酸化鉄、赤色227号、その他1成分を含有する。



4 987167 007263



製造番号

使用期限