



ご使用の前に、この添付文書を必ずお読み下さい。  
また、必要なときに読めるよう大切に保管して下さい。

## 便秘治療剤

# ラクサタン A

ラクサタンAは正常な排便習慣の回復を助ける便秘治療剤です。

ラクサタンAは結腸・直腸粘膜の副交感神経末端に作用して蠕動運動を高め、また、腸粘膜への直接作用により排便反射を促す刺激性下剤であります。

ラクサタンAは腸溶性糖衣錠であり、胃で溶けずに腸で溶け、的確に効果をあらわします。就寝時に服用すれば、翌朝に、また、空腹時に服用すれば、通常6～10時間位で作用をあらわします。大腸運動の改善に伴い、本剤の服用間隔を除々に延ばしてゆき、正常な排便習慣の回復にお役立てください。

### ⚠ 使用上の注意

#### ❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください。  
他の瀉下薬 (下剤)
2. 大量に服用しないでください。



#### ■ 相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください。
  - (1) 医師の治療を受けている人
  - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
  - (3) 本人又は家族がアレルギー体質の人
  - (4) 次の症状のある人  
はげしい腹痛、悪心・嘔吐
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。
  - (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
消化器	はげしい腹痛、悪心・嘔吐

- (2) 1週間位服用しても症状がよくなる場合
3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください。  
下痢

### 〔成分・分量〕

ラクサタンAは淡赤色の腸溶性糖衣錠で、次の成分を含んでいます。

1日最大服用量 (3錠) 中 ビサコジル……………15.0mg

添加物として、乳糖、セルロース、CMC-Ca、マクロゴール、ステアリン酸Mg、  
ヒドロキシプロピルメチルセルロースフタレート、グリセリン脂肪酸エステル、  
酸化チタン、アラビアゴム、ゼラチン、タルク、白糖、炭酸Ca、CMC-Na、  
カルナウバロウ、サラシミツロウ、赤色3号を含有しています。

## 〔効能・効果〕

○便秘

○便秘に伴う次の諸症状の緩和：頭重、のぼせ、肌あれ、吹出物、食欲不振（食欲減退）、腹部膨満、腸内異常醱酵、痔


## 〔用法・用量〕

下記の用量を1日1回就寝前又は空腹時かみくだかずに服用してください。

便秘の程度	成人(15歳以上)	11歳以上15歳未満	11歳未満
2～3日便通がないとき	1～2錠	1錠	服用しないこと。
4日以上便通がないとき	2～3錠	1～2錠	

ただし、便秘の程度、状態には個人差があるので、初回は最小量を用い、便通の具合や状態をみながら増量又は減量してください。

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 服用前後1時間以内に牛乳又は制酸剤の服用を避けてください。
- (3) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (4) 錠剤の取り出し方（シートごと飲み込むと、のどに突き刺さるなど思わぬ事故につながる場合があります。）



## 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。）

### 本品に関するお問い合わせ

オール薬品工業株式会社 ぐすり相談室  
〒661-0953 尼崎市東園田町2丁目106番地  
TEL (06) 6491-6222  
電話受付時間：月～金（祝・祭日を除く）  
9：00～17：00