

第2類医薬品

まおうとう

# 阪本漢法の麻黄湯 顆粒

眠くなる成分は入っていません

ふしぶしの痛み、  
鼻かぜ、発熱、  
さむけのある感冒に



有効成分  
そのまま!

飲みやすくなりました  
(1包あたり3g→1g)

満量服少®

## 満量処方

日本薬局方 麻黄湯エキス  
1日最大量 15.5gの生薬から  
抽出して得られたエキスを  
全量配合した顆粒剤

### 【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。  
(服用の原因によって品質が変わります。)
- (4) 湿気などにより薬が固化する場合がありますので、1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、速やかに服用してください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

【お客様相談室】 ☎ 06-6423-0565  
(祝日を除く月～金曜日10:00～17:00)

### 【製造販売元】

株式会社 阪本漢法製薬  
兵庫県尼崎市名神町1-5-12

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

顆粒

# 阪本漢法の 麻黄湯

まおうとう

## 満量 処方

セルフメタケーション  
税 控除 対象

9包

第2類医薬品

眠くなる成分は入っていません

ふしぶしの痛み、発熱、  
さむけのある感冒、鼻かぜに



4 987076 627507

製造番号

使用期限



袋:PE、金属



箱

漢方製剤

この箱は本剤とともに保管し、  
服用の際にはよくお読みください。

第2類医薬品

【販売名】 阪本漢法の麻黄湯顆粒

### 【効能・効果】

体力充実効果、かぜのひきはじめて、さむけが  
して発熱、頭痛があり、せきが出て身体のふし  
ぶしが痛く汗が出ていないものの次の諸症：  
感冒、鼻かぜ、気管支炎、鼻づまり

### 【用法・用量】

1日3回食前又は食間に水かお湯で服用して  
ください。

年齢	1回量	服用回数
成人 (15歳以上)	1包	1日3回
7歳以上 15歳未満	2/3包	
4歳以上 7歳未満	1/2包	
4歳未満	服用しないでください	

※食間とは食後 2～3 時間を指します。

### ＜用法・用量に関する注意＞

小児に服用させる場合には、保護者の指導  
監督のもとに服用させてください。

### 【成分・分量】

成人1日量3包(1包1.0g)中 日局 麻黄湯エキス 1.92g

成分	分量	成分	分量
日局 マオウ	5g	日局 ケイヒ	4g
日局 キョウニン	5g	日局 カンゾウ	1.5g

より製した乾燥エキス

添加物：乳糖水和物、結晶セルロース、軽質  
無水ケイ酸、ステアリン酸マグネシウム

※本剤は天然物(生薬)のエキスを用いて  
いますので、顆粒の色調等が多少異なる  
ことがあります。

押して開ける

### △使用上の注意

#### ⊗【してほしくないこと】

- (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)
1. 次の人は服用しないこと 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)
  2. 短期間の服用にとどめ、連用しないこと

#### 📞【相談すること】

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
  - (1) 医師の治療を受けている人
  - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
  - (3) 胃腸の弱い人
  - (4) 発汗傾向の著しい人
  - (5) 高齢者
  - (6) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
  - (7) 次の症状のある人：むくみ、排尿困難
  - (8) 次の診断を受けた人：高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気、食欲不振、胃部不快感
その他	発汗過多、全身脱力感

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症状
偽アルドステロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、 脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

3. 1ヵ月位(感冒、鼻かぜに服用する場合には5～6回)服用しても症状がよくなる  
ない場合は服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

S3