

開封口

すっとなじむスプレータイプ

ヘパリン類似物質配合 顔や手足の乾燥肌治療に

- 逆さでも使える正倒立スプレー採用
- 潤滑剤 リビジュア®(※)配合
- ステロイド無配合
- 無着色

ヘパリン類似物質の作用



おすすめの使い方

1日1～数回、洗顔後や入浴後などの清潔な肌に、噴霧してください。顔には適量を手にとり塗ってください。



逆さでも使える!



(※) 2-メタクリロイルオキシエチルホスホリルコリン・メタクリル酸ブチル共重合体液

リビジュアは日油株式会社の登録商標です。

健栄製薬株式会社
大阪府中央区伏見町2丁目5番8号

健栄製薬(株)お問い合わせ先
電話番号(06)6231-5822
受付時間 9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

【効能効果】

手指の荒れ、ひじ・ひざ・かかと・くろぶしの角化症、手足のひび・あかざ、乾皮症、小児の乾燥性皮膚、しもやけ(ただれを除く)、きず・やけどのあとの皮膚のしこり・つっぱり(顔面を除く)、打身・ねんざ後のはれ・筋肉痛・関節痛

【用法用量】

1日1～数回、適量を患部に噴霧してください。顔には適量を手にとり塗布してください。

〈用法用量に関連する注意〉

- (1) 用法用量を厳守してください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させていただきます。
- (3) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (4) 外用にのみ使用してください。
- (5) 噴霧する時には、吸入しないよう注意して使用してください。

【成分分量】

100g中 ヘパリン類似物質 0.3g 含有
添加物：グリセリン、1,3-ブチレングリコール、マクロゴール1500、2-メタクリロイルオキシエチルホスホリルコリン・メタクリル酸ブチル共重合体液、クエン酸水和物、クエン酸ナトリウム水和物、パラオキシ安息香酸プロピル、パラオキシ安息香酸メチル

【保管及び取扱上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所にキャップをして保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

④登録商標

副作用被害救済制度の問合せ先
(独)医薬品医療機器総合機構
http://www.monda.go.jp/kenkouhiga_camp/index.html
電話 0120-149-931(フリーダイヤル)

健栄製薬

乾燥肌治療

ヒルマイルド® スプレー

ヘパリン類似物質

0.3%配合
100g



第2類
医薬品

第2類医薬品

販売名： ヒルマイルド®スプレー

ご使用に際して、外箱の説明文を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

⚠ 使用上の注意

してはいけないこと

- (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)
1. 次の人を使用しないでください
 - (1) 出血性血液疾患(血友病、血小板減少症、紫斑病等)の人。
 - (2) わずかな出血でも重大な結果をきたすことが予想される人。(血液凝固抑制作用を有し出血を助長するおそれがあります。)
 2. 次の部位には使用しないでください
目や目の周囲、粘膜(口腔、鼻腔、膈等)。

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(3) 湿潤やただれのひどい人。
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、紫斑

3. 5～6日間使用しても症状がよくなる場合、使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

製造番号
使用期限

