

外用殺菌消毒薬

日本薬局方

第3類医薬品

ベンザルコニウム塩化物液
ザルコニン[®]液P

(逆性石けん液)

ZALKONIN[®] SOLUTION P

【使用上の注意】



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の部位には使用しないでください
顔面、陰股部（陰のう等）
2. そのままの液では使用しないでください

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(3) 患部が広範囲の人。
(4) 深い傷やひどいやけどの人。
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【効 能 効 果】

手指・創傷面の殺菌・消毒、口腔内の殺菌・消毒

【用 法 用 量】

本品を次のように水で希釈して、塗布または洗浄してください。

1. 手指の殺菌消毒

ベンザルコニウム塩化物として0.05～0.1%
(本品の100～200倍液)

2. 創傷面の殺菌消毒

ベンザルコニウム塩化物として0.01～0.025%
(本品の400～1000倍液)

3. 含嗽（うがい）の場合

ベンザルコニウム塩化物として0.005～0.01%
(本品の1000～2000倍液)

〈用法用量に関連する注意〉

- (1) 用法用量を厳守してください。
- (2) 患部に軽く塗るだけにとどめ、ガーゼ、脱脂綿等に浸して貼付しないでください。
- (3) そのままの液又は濃厚液が皮ふに付着した場合は、炎症を起こすことがありますので、すぐに水で洗い流してください。
- (4) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。

- (5) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (6) 石けん類は本剤の殺菌作用を弱めますので、石けん分を洗い流してから使用してください。
- (7) 外用にのみ使用してください。

【成分分量】 100mL中 ペンザルコニウム塩化物10g含有（10w/v%）

〈成分分量に関連する注意〉

- (1) 皮革製品に付着した場合は、変質させることがありますので注意してください。
- (2) 染色した布地は退色することがありますので注意してください。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わることがあります。）
- (4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

〈貯法〉

気密容器。室温保存。

【その他の公衆衛生・家庭衛生分野での使用法】

1. 食器・器具類の消毒

茶碗、皿、コップ、ナイフ、包丁類、調理器具等は水洗いした後、本品の200～500倍液に5分間以上浸した後水洗いしてください。

2. 家屋、乗物等の消毒

床、畳、家具、調度品、手洗場、浴槽、便所、座席、手すり、電話機等は本品の200～500倍液で清拭するか又は噴霧してください。

3. 塵芥箱、冷蔵庫の消毒

本品の100～200倍液を噴霧してください。

4. その他

食品工場、清涼飲料水工場、缶詰・製菓工場の施設、器具の消毒には本品の200～500倍液を用いてください。

【希釈方法】

●100倍液：キャップで下記に示す位置まで本品を2杯とり、水1Lにうすめてください。以下同様にうすめてください。

- 200倍液：本品1杯に水1L
- 400倍液：本品1杯に水2L
- 500倍液：本品2杯に水5L
- 1000倍液：本品1杯に水5L
- 2000倍液：本品1杯に水10L



(キャップ)

必ずうすめてご使用ください

【包装】 500mL