

第2類医薬品

使用前にこの説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

漢方外用薬

し 紫 雲 膏 ダイコー

紫雲膏は、いわゆる漢方製剤で、古くからひび、あかぎれ、しもやけ等に繁用されてきました。弊社の製品を常備薬として、ご使用願えれば幸いです。



使用上の注意



相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
 - (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (4) 湿潤・ただれ・やけど・外傷のひどい人。
 - (5) 傷口が化膿している人。
 - (6) 患部が広範囲の人。
2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください

使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

【効能又は効果】

ひび、あかぎれ、しもやけ、魚の目、あせも、ただれ、外傷、火傷、痔核による疼痛、肛門裂傷、湿疹・皮膚炎*

【用法及び用量】

適宜患部に塗布するか、ガーゼ等に展延し患部に貼付する。

(ご使用前に患部を清潔にし、傷に塗る場合には消毒をしてからご使用されると効果的です。)

〈用法及び用量に関連する注意〉

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) 外用にのみ使用してください。
- (3) 目に入らないよう注意してください。
- (4) 衣類等につかないよう注意してください。(赤紫色の軟膏のため。)

(裏面をお読みください)

【成分及び分量】

成 分	含 量
ト ウ キ	100g
シ コ ン	100g
ゴ マ 油	1,000g
ミ ツ ロ ウ	380g
豚 脂	25g

上記の全量 1,605g から得られる紫雲膏は約 1,300g。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

本品についてのお問い合わせは、
お買い求めのお店又は下記にお願いいたします。

大晃生薬株式会社 試験室

電話：フリーダイヤル 0120-335064

受付時間：9時～12時、13時～17時（土・日・祝日を除く）

本品の取り扱い販売店をお探しの場合は、下記にお願いいたします。

小太郎漢方製薬株式会社 医薬事業部 お客様相談室

電話：06-6371-9106

受付時間：9時～17時30分（土・日・祝日を除く）

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独) 医薬品医療機器総合機構

<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>

電話：フリーダイヤル 0120-149-931

発売元



小太郎漢方製薬株式会社

〒531-0071 大阪市北区中津2丁目5番23号

製造販売元



大晃生薬株式会社

〒464-0084 名古屋市千種区松軒一丁目5番12号