

服用に際して、この添付文書をよくお読みください。  
また、必要な時読めるよう大切に保管してください。

乳酸菌、納豆菌、消化酵素

# ナチュラーゼLX錠

第3類医薬品

胃と腸は健康のバロメーターと云われる程、大切なものです。  
食生活の欧米化や即席、外食が多くなり、高齢化社会やストレスなどが原因で、下痢、便秘など大腸に不安を抱える人が増加し、又、胃の機能が弱って各種の胃障害を起こします。  
このため、すぐれた効きめの消化・整腸薬の必要性が、ますます高まっています。

本剤は、強い働きをもった乳酸菌、納豆菌が腸内で作用し、大腸の調子を正常に近づけると共に、胃の機能を高め、健全な胃を守ります。

## 〔特 徴〕

- 本剤の納豆菌(糖化菌)は、Bacillus Subtilis BN株で、悪玉菌を抑制するだけでなく、乳酸菌、ビフィズス菌を増殖し、弱った腸の状態を改善します。
- 本剤の乳酸菌(ラクトミン)は、Streptococcus Faecalis BIO株で、腸内の悪玉菌の増殖を抑制し、大腸を正常な働きに整えます。
- ピオヂアスターゼ(複合消化酵素)は、でんぷん、たんぱく消化力が強く、胃の機能を助けます。
- ジメチルポリシロキサンは、腸管内にたまったガスの排出を促進します。
- センブリ、ケイヒ、ウイキョウの健胃成分が、弱った胃の働きを高め、消化を良くし、大腸への負担をやわらげます。
- MMSC(メチルメチオニンスルホニウムクロライド)は、荒れた胃の粘膜を修復します。

## ! 使用上の注意



### 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
(1) 医師の治療を受けている人。(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。  
(3) 甲状腺機能障害の診断を受けた人。(4) 抗凝血剤「ワルファリン」を服用している人。
2. 服用後、皮膚部に発疹・発赤、かゆみの症状があらわれた場合は、副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
3. 服用後、下痢、便秘の症状が持続又は増強した場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
4. 2週間位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

## ●成分・分量(9錠中)

糖化菌(納豆菌)(バチルススブチリスBN株) .....	120mg
ラクトミン(乳酸菌)(ストレプトコッカスファエカリスBIO株) .....	100mg
ピオヂアスターゼ .....	60mg
センブリ末 .....	30mg
ジメチルポリシロキサン .....	120mg
ケイヒ末 .....	30mg
メチルメチオニンスルホニウムクロライド(MMSC) .....	30mg
ウイキョウ末 .....	30mg
沈降炭酸カルシウム .....	300mg
炭酸マグネシウム .....	300mg

添加物として、ヒドロキシプロピルセルロース、バレイショデンプン、*l*-メントール、結晶セルロース、軽質無水ケイ酸、ステアリン酸マグネシウムを含有します。

## ●効能

整腸(便通を整える)、軟便、便秘、胃部・腹部膨満感、消化不良、消化促進、もたれ、胃弱、食欲不振、食べ過ぎ、飲み過ぎ、はきけ、嘔吐、胸やけ、胸つかえ

## ●用法・用量

成人(15才以上) ..... 1回3錠 11才以上15才未満 ..... 1回2錠 1日3回食後に服用してください。  
注意 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

## 保管及び取扱い上の注意

(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。(2) 小児の手のとどかない所に保管してください。(3) 本品は生菌・酵素剤ですから、中味が変色しないよう必ず密栓してください。(4) 服用に際し、水分を落としたり、ぬれた手で触れないようにし、万一ぬれた場合は、その錠剤を捨ててください。(5) 本品は素錠のため、錠剤表面の色が一定でない場合や僅かに斑点を認めても、品質に関係がないので、安心して服用してください。(6) 外箱に表示した使用期限内に服用してください。

発売元 福地製薬株式会社  
滋賀県蒲生郡日野町寺尻824

製造販売元 米田薬品工業株式会社  
奈良県高市郡高取町市尾986

副作用被害救済制度 TEL0120-149-931

本品について お客様相談室 ☎0120-18-3548  
のお問合せ先 月~金曜日 10:00~16:00(祝祭日、特定日を除く)

1209E