

使用に際して、この説明文書を必ず読むこと
必要時に読めるように大切に保管すること

第2類医薬品

みずむし・たむし用薬

ピロエースW液

〔ピロエースW液の特徴〕

1. すぐれた抗白癬菌作用があります

抗生素質ピロールニトリンと抗真菌剤クロトリマゾールの協力作用により、効率的に白癬菌を消失させ、炎症等の症状を改善します

2. かゆみ止め成分を配合しています

クロタミトンが、かゆみに効果を發揮します。また、l-メントールを配合していますので、スッとしたさわやかな清涼感がのこります



〔使用上の注意〕



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の部位には使用しないでください

- (1) 目や目の周囲、顔面、粘膜(例えば、口腔、鼻腔、膣等)、陰のう、外陰部等
- (2) しつしん
- (3) 濡潤、ただれ、亀裂や外傷のひどい患部



相談すること

1. 次の人は使用前に医師または薬剤師にご相談ください

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 乳幼児
- (3) 本人または家族がアレルギー体質の人
- (4) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (5) 患部が広範囲の人
- (6) 患部が化膿している人
- (7) 「しつしん」か「みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし」かがはっきりしない人(陰のうにかゆみ・ただれ等の症状がある場合は、しつしん等他の原因による場合が多い)

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師または薬剤師にご相談ください

- (1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 ふ	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、はれ、刺激感、熱感、疼痛、ただれ

- (2) 2週間位使用しても症状がよくならない場合
- (3) 使用後、症状がかえって悪化した場合(ただれたり、化膿したり、病巣が使用前より広がる等)

〔効能〕

みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし

【使用法】


1日2~3回、適量を患部に塗布してください

- (1) 患部やその周囲が汚れたまま使用しないでください
- (2) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けてください
- (3) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください
- (4) 外用にのみ使用してください

プッシュ式容器の使い方

使用前


温度の高い場所に置かれた場合や薬液が少なくなった場合、容器の中の圧力が高くなり薬液が多く出ることがありますので、使用前に容器の先端を上に向けて、手の指で先端部分を押して中の空気を抜いてください



使用中

使用する際は、容器の先端を下に向けて、患部に軽く押しあてて塗布してください。先端を押したままになると、薬液が出続けますのでご注意ください

押す（薬液が
出る） はなす（薬液が
止まる）



患部をよく洗ってから薬剤を塗布してください。患部の汚れをとると同時に皮膚をやわらかくして薬剤の浸透を助けます。この意味から入浴後の治療は効果的です

みずむし・たむしは再発しやすい病気ですから、自覚症状がなくなってからもしばらくの間は治療を続けることが大切です

【成分・分量】

本剤は、無色～微黄色透明の液で、1mL中に次の成分を含有する

ピロールニトリン	2mg(力価)
クロトリマゾール	4mg
クロタミトン	50mg
l-メントール	10mg

添加物:1,3-ブチレングリコール、ゲラニオール、エタノール

本剤はアルコールを含んでいますので、しみることがあります

【保管および取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください
- (3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり、品質が変わる)
- (4) 火気に近づけないでください
- (5) 本剤は化学繊維、プラスチック類、塗装面等を溶かしたりすることがありますので、床、家具、メガネ等につかないようにしてください
- (6) 表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないでください

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願い致します

第一三共ヘルスケア株式会社 お客様相談室

〒103-8541 東京都中央区日本橋小網町1-8

電話 03(6667)3232

受付時間 9:00~17:00(土,日,祝日を除く)

ホームページ <http://www.daiichisankyo-hc.co.jp/>

®登録商標



販売元
第一三共ヘルスケア株式会社

Daiichi-Sankyo 東京都中央区日本橋小網町1-8

製造販売元

ホシエヌ製薬株式会社

奈良県五條市住川町1380番地

DK