



(1枚 10cm×14cm)



バンテリンコーワ パットEXホット **大判** サイズ


ツライ痛みにはジカに効く!

腰痛 肩こり痛

温感 タイパ

トリプル鎮痛処方

インドメタジン アルニカチンキ トウガラシエキス



TIAAS[®]製剤
(薄型含水貼付剤)

セルフメディケーション
税 控除 対象

第2類医薬品

バンテリン^{コウ}パットEXホット

△使用上の注意

❌してはいけないこと

- (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)
1. 次の人は使用しないでください(1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。(2)ぜんそくを起こしたことがある人。(3)15歳未満の小児。
 2. 次の部位には使用しないでください(1)目の周囲、粘膜等。(2)湿疹、かぶれ、傷口。(3)みずむし・たむし等又は化膿している患部。
 3. 長期連用しないでください

🗨️相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください(1)医師の治療を受けている人。(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。(3)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

| 関係部位 | 症 状 |
|------|----------------------------------|
| 皮 膚 | 発疹・発赤、かゆみ、はれ、痛み、かぶれ、ヒリヒリ感、熱感、乾燥感 |

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

■成分・分量(膏体100g中)

| 成分・分量 | 働 き |
|--------------------------------|---------------------------------|
| インドメタシン1.0g | 非ステロイド性の鎮痛消炎成分で、筋肉や関節の痛みをとります。 |
| アルニカチンキ1mL (アルニカとして0.2g) | キク科のアルニカから抽出したもので、炎症や痛みをやわらげます。 |
| トウガラシエキス0.4g (トウガラシとして5.0g) | 血液循環を促進し、痛みをやわらげます。 |

[添加物]l-メントール、ポリビニルアルコール(部分けん化物)、アクリル酸メチル・アクリル酸-2-エチルヘキシル共重合樹脂、ポリオキシエチレンノニルフェニルエーテル、ポリアクリル酸部分中和物、カルメロースNa、オレイン酸ソルビタン、グリセリン、D-ソルビトール、亜硫酸水素Na、エドト酸Na、ジヒドロキシアルミニウムアミノアセテート、乳酸、マクロゴール、アジピン酸ジイソプロピル

■効能・効果

肩こりに伴う肩の痛み、腰痛、関節痛、筋肉痛、腱鞘炎(手・手首の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、捻挫

この外箱は、使用の際にはよく読み、大切に保管してください。

(1枚 10cm×14cm)

■用法・用量

プラスチックフィルムをはがし、1日2回を限度として患部に貼付してください。

<用法・用量に関連する注意>

- (1)用法・用量を守ってください。(2)本剤は、痛みやはれ等の原因になっている病気を治療するのではなく、痛みやはれ等の症状のみを治療する薬剤なので、症状がある場合だけ使用してください。(3)汗をかいたり、患部がぬれている時は、よく拭きとってから使用してください。(4)打撲・捻挫等に使用する場合には、患部の熱感等の症状がおさまってから使用してください。(5)本剤を使用後、汗をかくと刺激を感じることがあります。(6)本剤に触れた手で、眼、鼻腔、口唇等の粘膜に触れないように注意してください。(7)本剤を貼った患部をコタツや電気毛布等で温めないでください。(8)本剤を貼ったまま、あるいははがした直後に入浴すると刺激を感じることがありますので、入浴の1時間以上前に、はがしてください。また、入浴後は30分程してから使用してください。(9)皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に、1～2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、はれ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。(10)連続して2週間以上使用しないでください。



■保管及び取扱い上の注意

- (1)高温をさけ、直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密封して保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)(4)品質保持のため、開封後の未使用分は薬袋に入れ、開口部のチャックをきちんとして密封し、保管してください。(5)使用期限(外箱及び薬袋に記載)をすぎた製品は使用しないでください。

製造販売元 **興和株式会社**
〒103-8433 東京都中央区日本橋本町三丁目4-14

お問い合わせ先 興和株式会社 お客様相談センター
TEL 03-3279-7755 月～金(祝日を除く)9:00～17:00

TIAAS[®]製剤の
詳しい情報は
コチラ



セルフメディケーション



副作用被害救済制度

☎ 0120-149-931

Languages

English

简体字

繁體字

한국어



<https://hc.kowa.co.jp/otc/tenpu>