

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

**目薬** **スマイルコンタクト AL-Wクール** **第3類医薬品**

## スマイルコンタクト AL-Wクールの特徴

コンタクトレンズ装用中の、「目のかゆみ」、  
「ゴロゴロ・はりつきなどの不快感」  
を抑える目薬です。

**W  
処方**

### かゆみを抑える

抗ヒスタミン成分  
クロルフェニラミンマレイン酸塩

### 炎症を鎮静する

グリチルリチン酸二カリウム



・うるおいを保ち  
角膜を保護する  
コンドロイチン硫酸エステルナトリウム

・涙本来の働きを補う  
酸素補給(L-アスパラギン酸カリウム)  
栄養補給(ピリドキシン塩酸塩)  
老廃物排出

## 清涼感レベル さし心地で選べる2タイプ



カラーコンタクトレンズをのぞくすべてのコンタクト  
レンズ装用中に使えます。

また、レンズをはずした後にもご使用いただけます。

**ソフト**

**ハード**

**O<sub>2</sub>**

**使い捨て**

※ソフトコンタクトレンズを装用したままでは使用でき  
ない目薬もありますので、表示をよくお確かめください。

防腐剤(塩化ベンザルコニウム、ソルビン酸カリウムなど)を  
配合していません。


## 【ツイストキャップの開閉方法】

キャップ部分をまっすぐ上にして開閉してください。

※容器の中心を押さえたまま開閉すると、薬液が飛び出すことがあります。  
容器の側面をもって開閉してください。


### ① 開け方

キャップを手前  
にひねります



### ② 閉め方

カチッと音が  
するまでまっすぐ  
押し下げます



## ⚠ 使用上の注意

### 👤 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
(1) 医師の治療を受けている人。  
(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。  
(3) 次の症状のある人。はげしい目の痛み  
(4) 次の診断を受けた人。緑内障
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ、しみて痛い

3. 次の場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
(1) 目のかすみが改善されない場合。  
(2) 2週間位使用しても症状がよくなる場合。

### ● 効能・効果

目のかゆみ、ソフトコンタクトレンズ又はハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感、目の疲れ、目のかすみ(目やにの多いときなど)、眼病予防(水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど)、紫外線その他の光線による眼炎(雪目など)

### ● 用法・用量

1日5~6回、1回1~2滴を点眼してください。

#### 〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) 容器の先をまぶた、まつ毛に触れさせないでください  
(汚染や異物混入(目やにやほこり等)の原因になります)。  
また、混濁したものは使用しないでください。
- (3) 点眼用にのみ使用してください。



容器の先を下に向けて点眼

### ● 成分(100mL中)

有効成分	含 量
グリチルリチン酸二カリウム(抗炎症成分)	0.125g
クロルフェニラミンマレイン酸塩(抗ヒスタミン成分)	0.03g
ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB <sub>6</sub> )	0.01g
L-アスパラギン酸カリウム(アミノ酸成分)	0.2g
コンドロイチン硫酸エステルナトリウム(角膜保護成分)	0.5g

\*添加物として、トロメタモール、ホウ酸、ホウ砂、塩化Na、エデト酸Na、プロピレングリコール、*l*-メントール、*d*-ボルネオール、pH調整剤を含む。

### ● 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。品質を保持するため、自動車内や暖房器具の近くなど高温の場所(40℃以上)に放置しないでください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります)。
- (4) 他の人と共用しないでください。
- (5) 使用期限(外箱の底面に書いてあります)の過ぎた製品は使用しないでください。  
なお、使用期限内であっても一度開封した後は、なるべく早く(2~3ヶ月を目安に)ご使用ください。
- (6) 容器を横にして点眼したり、保存の状態によっては、容器の先やキャップ部分に成分の結晶が付着することがあります。その場合には清潔なガーゼで軽くふき取ってご使用ください。

※この目薬は、携帯袋を入れておりません。

ライオン株式会社  
〒130-8644 東京都墨田区本所1-3-7

お問合せ先  
ライオン株式会社 お客様センター

0120-813-752

受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)